合川日报
2022年11月25日 星期五 责编:王利 美编:邓舒月

齐心“合”力 携手抗“疫”

进一步提升防控的科学性、精准性

——二十条优化措施热点问答之一

不再判定密接的密接，取消入境航班熔断机制，将风险区调整为“高、低”两类，纠正核酸检测“一天两检”“一天三检”等不科学做法，加快新冠肺炎治疗相关药物储备……二十条优化措施公布后，引起社会广泛关注。

各地相继落实二十条优化措施。风险区如何划定？密接、时空伴随等怎样判定？坚持做核酸有无必要？聚焦落实过程中公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出权威回应。

问题一：二十条优化措施是否意味着放松防控？是否会加大疫情传播的风险？

答：优化调整防控措施不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点，坚持既定的防控策略和方针，进一步提升防控的科学性、精准性。

这些调整，是基于多地疫情防控实践的经验总结和相关评估数据作出的。近三年来，我国根据全球疫情形势和病毒变异情况，结合我国疫情防控实践经验，因时因势优化调整防控措施。每一次调整优化，都经过反复研判、科学论证，确保积极稳妥、风险可控。

二十条优化措施是稳中求进、走小步不停步、符合我国国情、更加科学精准的举措。这些调整要求更规范、更快速地开展防控，把该管住的重点风险管住、该落实的落实到位、该取消的坚决取消，充分利用资源，提高防控效率。

问题二：有群众反映，其所在地方提出“社区暴发地区”“社区传播明显地区”等，二十条优化措施提出后，风险区如何划定？

答：二十条优化措施将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，在科学精准管控风险区域的前提下，最大限度减少管控范围和人员。

根据第九版防控方案的实践应用以及今年7、8月份的评估，中风险区的阳性检出率约为3/10万，风险极低。为尽可能减少管控区域和人员，取消了中风险区的划定。

根据二十条优化措施，原则上将感染者居住地以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域划定为高风险区，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大；高风险区所在县（市、区、旗）的其他地区划定为低风险区。高风险区连续5天未发现新增感染者，降为低风险区。符合解封条件的高风险区要及时解封。

问题三：有群众反映，目前有密接、时空伴随等多种判定。不同判定应采取什么样的防疫措施？

答：密接是密切接触者的简称，一般指疑似病例和确诊病例症状出现前2天开始，或无症状感染者标本采样前2天开始，与其有近距离接触但未采取有效防护的人员。第九版防控方案共列举了9种密接人员类型，包括共同居住人员等。

二十条优化措施中明确，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间赋码管理、不得外出。同时要求，及时准确判定密切接触者，不再判定密接的密接。

时空伴随人员是涉疫场所的暴露人员。根据第九版防控方案，对于这类人员要求在流调以后进行“三天两检”，及时排查。

不论是哪种管控方式，管控时间都是以人员末次暴露的时间开始计算。对于管控的时间，起始时间应该以判定为末次暴露的时间为准，而不应该以追踪到这个密接的时间开始算起。

问题四：当前，有的城市减少核酸检测点位的同时，要求出入公共场所出具核酸阴性证明。不少群众关心：是否需要坚持做核酸检测？

答：根据第九版防控方案，发生疫情以后，基于流调研判，明确传播链清晰，没有发生社区传播，无须开展区域全员核酸检测，只需对风险区域和重点有感染风险的人员进行核酸检测，开展快速疫情处置。

二十条优化措施进一步强调，没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测，只在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时开展。

二十条优化措施还要求，制定规范核酸检测的具体实施办法，重申和细化有关要求，纠正“一天两检”“一天三检”等不科学做法。

（据新华社）

群众匿名送蛋糕祝防疫人员“喜乐安康”

本报讯（记者 **袁询** 摄影报道）“有人送蛋糕来，没留名字，祝你们‘喜乐安康’！”带着一脸笑容，一位外卖小哥小心翼翼拿出一个方盒子，端端正正摆在身穿防疫服的民警孙斌面前。透过晶莹剔透的塑料外壳，里边赫然是一个大蛋糕。

看到这句话，包括民警在内，在场所有值守防疫工作人员先是一愣，紧接着，大家的鼻子都酸了起来……

11月19日中午12时许，在杨柳街防疫卡口驻守的区公安局经侦支队民警孙斌刚刚协助做完物资运送等工作，正打算坐下歇歇，一位外卖小哥突然来到他面前。

“您好，是有外卖要送到里面去吗？放在我这里就可以了。”孙斌下意识准备伸手去接，但外卖小哥却并没着急拿东西，而是笑着说：“不，这个是送给你们的！”随即他从外卖箱里端出一个大盒子，轻轻放到孙斌面前。

“有人送蛋糕给你们，没留名字，祝福你们‘喜乐安康’！”原来，外卖小哥接到这份订单后，立即赶往蛋糕店，一看是送给防疫人员的，一路上小心翼翼，生怕把蛋糕弄坏了，直到安全送达，这才松了口气。“你们的辛苦付出大家都看在眼里，感谢你们！”外卖小哥说。

看着蛋糕上用巧克力写的“祝全体防疫人员喜乐安康”这句祝福，在场所有防疫人员瞬间破了“防”。“我当时鼻子一下就酸了。”孙斌说，当时在场的工作人员都很开心，眼里也都沁出了泪花。

防疫人员收到爱心蛋糕

“这个蛋糕是群众对我们的认可，我们都舍不得吃，它已经甜在了我们心里！”孙斌说，他曾试图寻找是谁送的蛋糕，但毫无头绪，“大家非常想对这位群众表示感谢，感谢他对我们工作的支持、理解和关心。”

据了解，孙斌已在此连续值守了6天时间，此前还负责街面巡逻工作，他的妻子李小玉是盐井社区卫生服务中心的一名医生。疫情发生以来，他和妻子各自奋战在抗疫一线，家中1岁多的孩子只能由70多岁的母亲照看。有时母亲上街买菜，只能将孩子用屏障围起来。每每看到孩子哭闹的画面，他和妻子都非常难过。

“特殊时期，奋战一线的工作人员都是负重前行，但再苦再难，总有过去的一天。喜乐安康，就是我们共同的心愿。”孙斌说。

党建赋能·赶考竞卷

区融媒体中心党总支

党员下“疫”线 合力战疫情

区融媒体中心党员下沉社区协助开展核酸采样工作

本报讯（记者 **苟勇** 摄影报道）疫情肆虐，大爱无疆，媒体党员，合力战疫。自本轮新冠肺炎疫情发生以来，区融媒体中心党总支快速响应，迅速行动，精心组织机关党员干部下沉社区，积极发挥党员先锋作用，齐心合力共战疫情。

闻令而动冲“疫”线。接到11月3日晚上实行全员核酸检测的消息后，区融媒体中心党总支第一时间与南津街街道上什字社区党委对接，并成立了以党委副书记为队长的志愿服务队，迅速组织20名党员干部去到社区协助开展疫情防控工作。

各尽所能守“疫”线。在疫情防控中，20名党员干部分成梨园路廉租房、建博城和铜合花园三个核酸检测服务组和6个社区卡点值守组。在核酸采样工作中，党员干部充分发挥自身特长，有的同志进行信息录入，有的同志维持现场秩序，还有的同志开展疫情防控政策宣传。在社区卡点值守中，6名党员与社区工作人员密切配合，对社区6个卡点进行24小时蹲点值守，及时有效地帮助小区居民解决生活实际困难和问题。

勠力同心战“疫”线。在疫情防控工作中，区融媒体中心党总支党员干部每天全员到岗，累计参加志愿服务380人次，政策宣讲300余人次，解决群众生活实际问题50余人次，用实际行动书写了主流媒体人的责任和担当，切实提升了主流媒体的亲民性。接下来，区融媒体中心党总支党员干部将密切关注疫情态势，持续与社区沟通协调，用疫情不退不收兵的韧劲，积极为全区疫情防控工作添砖加瓦。

新冠肺炎疫情一线工作人员个人防护要求之四

交通领域工作人员个人防护应知应会

个人防护天天讲

一、铁路工作人员

1.风险岗位人员严格实行闭环管理，及时梳理工作人员的旅居史，规范执行居家隔离、健康监测等管理措施。杜绝不满足疫情防控要求的人员进入铁路施工现场、铁路站场等。

2.开展工作人员的健康监测，每日进行体温检测，及时排查存在发热、咽痛等健康异常情况。

3.配齐配足疫情防控物资，设置观察室、隔离室等防控设施。落实通风、消毒等预防措施，特别是对食堂、厕所等人员聚集地要适当加大清洁和消毒频次。

二、道路客运工作人员

1.长途汽车站工作人员要实施分类闭环管理，加强交通场站的消毒通风，督促道路客运驾驶员、交通场站工作人员严格做好个人防护，充足配备口罩、手套、防护服、消毒液等必要的防护消杀用品。

2.加强闭环转运相关人员的个人防护培训，闭环转运工作人员要穿戴一次性工作帽、一次性手套、医用防护服、医用防护口罩、防护面屏或护目镜，转运密接接触者要佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩或以上级别口罩和一次性手套。

3.转运车辆要严格做到驾驶室和车厢物理隔离，车内设专门的污染物品放置区域，配备防护用品、消毒液、快速手消毒剂和医疗垃圾袋等防护用品。

三、城市公共交通工作人员

1.轨道交通查验人员、城市公交和出租汽车驾驶员工作期间要规范佩戴口罩，乘客要规范佩戴口罩乘坐中心城区城市公共交通和出租汽车。

2.轨道站点和常规公交车辆要加大场站、车辆消毒通风频次，轨道站点对进站旅客开展体温检测，保持“1米线”。

3.工作人员要实施分类闭环管理，工作人员如出现异常要立即做好核查登记，并做好留观和向辖区疫情防控领导机构移交等工作。

四、交通卡口工作人员

1.一般要求

在低风险工作状态下，仅需穿戴工作服、一次性工作帽、一次性手套及医用外科口罩即可；如需进入中、高风险工作状态，口罩需换成医用防护口罩，并加戴防护面屏或护目镜、靴套等防护用品。

2.人员分类防护要求

（1）引导、分流等非近距离接触工作人员：穿戴工作服、一次性工作帽、医用外科口罩、一次性乳胶手套。

（2）体温检测、查验、登记、咨询等近距离接触工作人员：穿戴一次性工作帽、医用外科口罩或KN95/N95及以上级别的防护口罩、防护面屏或护目镜、隔离衣（蓝色）、一次性乳胶手套。

（3）采样人员：穿戴一次性工作帽、双层乳胶手套、医用防护服、KN95/N95及以上级别的防护口罩或医用防护口罩、防护面屏或护目镜、工作鞋、防水靴套，必要时，可加穿防水围裙或防水隔离衣。

3.防护措施

（1）卡口附近规范设置临时留观点、核酸采样点、医废暂存点和工作人员休息区，工作人员休息区设置在上风向，各点设置于相对独立、通风良好的区域，与人员排查区域保持一定距离。

（2）工作人员每日进行自我健康监测，工作期间每日开展一次核酸检测，若出现发热、咳嗽或其他可疑症状时，立即停止工作并报告单位，根据病情及时就医。在“五一”等假期人流较大或国内疫情比较严重的工作时期实行闭环管理（不回家，工作地和住宿地点对点）；其他工作时间实行相对闭环管理（家和工作地点对点，不聚餐聚会，前往人员密集公共场所，不乘坐公共交通工具）。

（3）工作时，第一时间要求查验对象规范佩戴口罩，避免近距离接触，尽量减少交谈时间。

（4）工作岗位相对固定，非本职岗位人员不得前往核酸采样点、医废暂存点、临时留观点等高风险区域。

（5）避免在工作区域内饮水、就餐、抽烟等无口罩防护的行为。采取错时、错峰用餐。

（6）工作时全程规范佩戴口罩，如口罩出现脏污、变形、损坏或有异味时要及时更换，佩戴和摘除口罩前、后要进行手卫生，手一旦可疑被污染应当立即使用速干手消毒剂进行手卫生。正确摘除口罩（摘除时不得触碰口罩外表面、面部），口罩摘除后丢弃在医废袋内。每日工作人员使用后的个人防护用品按医废收集处置。

4.消毒措施

每日至少一次对核酸采样点、临时留观点、医废暂存点的环境和物品表面使用500mg/L-1000mg/L的含氯消毒剂等进行喷洒、擦拭消毒。对经常触摸的设备、器具、台面等适当提高消毒频次。

（据《重庆市新冠肺炎疫情一线工作人员防护应知应会手册（试行）》）